Descrição morfológica

Kvcd

Solos Mólicos - Castanozemes, Argiluvitados, Vermelhos ou Amarelos, de calcários compactos ou dolomias

Horizonte	Espessura	Cor	Granulometria		Estrutura	Porosidade	Sup. agregados	Compacidade	Consistência	CaCo ₃	Concreções	pH	Transição	Observações
			Textura	El.gros seiros										
A1	15 a 25 cm	negro a negro pardacento	franco-argilo-limoso a argilo-limoso, húmifero		granulosa a grumosa e anisoforme subangulosa, finas, moderadas				aderente a pouco aderente, plástico a pouco plástico; friável				nítida	
B	10 a 40 cm	vermelho a pardo-avermelhado	argilo-limoso a argiloso		anisoforme subangulosa, finas moderada a forte		películas de argila nas faces dos agregados		muito aderente a aderente, muito plástico a plástico; firme a friável; rijo		por vezes pequenas concreções ferruginosas		nítida e irregular	
C	Material originário resultante da meteorização do calcário subjacente, e constituído por material de coloração amarelada e laivos esbranquiçados, de consistência branda e dando efervescência muito viva ao HCl, envolvendo resíduos da meteorização da rocha-mãe, numa espessura de escassos centímetros ou reduzida a uma película recobrando o substrato rochoso													
R	Calcário compacto ou dolomia													