

Descrição morfológica geral

Pat

Solos Argiluiados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais, de arenitos argilosos

Horizonte	Espessura	Cor	Granulometria		Estrutura	Porosidade	Sup. agregados	Compacidade	Consistência	CaCO ₃	Concreções	pH	Transição	Observações
			Textura	El. grossieiros										
A1	15 a 25 cm	castanho	franco-arenoso a franco-argilo-arenos		granulosa média e fina e anisoforme subangulosa média, fraca a moderada				muito friável ou friável				nítida	
B	10 a 30 cm	castanho-amarelado na superfície dos agregados, apresentando frequentemente manchas amareladas no seu interior	argiloso ou franco-argiloso		prismática grosseira forte, composta de anisoforme angulosa média forte		películas de argila na face dos agregados		muito firme ou firme					
BC	10 a 30 cm				prismática a cubóide média fraca		“						nítida	horizonte de transição caracterizado pela meteorização incompleta da rocha-mãe (elementos desta envolvidos por fina camada de meteorização pardo-acinzentada e mais ou menos argilosa)
Arenito arcósico argiloso praticamente por meteorizar, apenas se destacando em “placas” sucessivamente mais espessas com a profundidade. Aparecem por vezes recobrimentos calcários nas superfícies das referidas “placas” em que se destaca														