

Descrição morfológica geral

Pmn

Solos Argiluvitados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais, de rochas cristalofílicas

Horizonte	Espessura	Cor	Granulometria		Estrutura	Porosidade	Sup. agregados	Compacidade	Consistência	CaCo ₃	Concreções	pH	Transição	Observações
			Textura	El.grosseiros										
A1	15 a 30 cm	pardo-amarelado-escuro ou pardo-acinzentado-escuro	franco-arenosa ou areno-franca, por vezes franca	normalmente com saibro e cascalho subangulosos de quartzo	granulosa média ou grosseira fraca				muito friável ou solto				nítida	
B1	10 a 15 cm	pardo ou pardo-amarelado-escuro	franca ou franco-argilo-arenosa	“	anisforme grosseira e média, moderada a fraca				friável				“	
B2	15 a 30 cm	pardo-oliváceo, por vezes com algumas ou bastantes manchas pardo-amareladas e pardo-acinzentadas escuras	franco-argilosa a argilosa, por vezes franco-argilo-arenosa	normalmente com saibro e cascalho subangulosos de quartzo e de rocha-mãe	anisforme angulosa muito grosseira forte, por vezes tendente para prismática média moderada		películas de argila		firme		com algumas concreções ferruginosas		gradual	
C	proveniente da meteorização de rochas cristalofílicas, nomeadamente xistos e gneisses													

Nota: Este solo ocorre normalmente associado a Px e Ppn e, por vezes, a Pv e a Pm de rocha cristalofílica.