



ACTUALIZAÇÃO DA LISTA DE PROTECÇÃO INTEGRADA DE HORTÍCOLAS

Substâncias activas aconselhadas e produtos comerciais incluídos em protecção integrada de hortícolas Família das Quenopodiáceas cultura da beterraba sacarina

SUBSTÂNCIA ACTIVA E PRODUTO COMERCIAL INCLUÍDO

INSECTICIDAS E ACARICIDAS						
finalidade	substância activa	form	conc. g s.a/hl	CT	IS (dias)	Produto comercial
afídeos	fosalona (*)	WP	60	Xn;N	21	ZOLONE (*)
	pirimicarbe (*) (1)	WP	25	T;N	21	PIRIMOR G (*); STOPPER (*)
	lambda-cialotrina ⑥	CS	1,5 (10)	Xn;N	7	KARATE with ZEON technology

Obs

(*) – alargamento de espectro para uso menor.

⑥ – substância activa considerada por não haver alternativa satisfatória.

(1) – nº preconizado de aplicações: 2. Pulverizar ao aparecimento da praga, de Março a Setembro, quando atingir o nível de 5 formas aladas ou 5 colónias/50 plantas.

(2) – a aplicação faz-se exclusivamente por meios mecânicos na linha e no momento da sementeira.

(3) – equivalente a 0,025g sa/m linear com um compasso de 40 cm entre as linhas.

(4) – não utilizar após a sementeira ou plantação.

(5) – nº máximo de aplicações: 2

(6) – aplicar por pulverização ao aparecimento da praga, quando atingir o nível de 5 adultos/50 plantas.

(7) – nº preconizado de aplicações: 3

(8) – aplicação por pulverização ao aparecimento da praga.

(9) – substância activa homologada para desinfestação do solo.

(10) - efectuar 1 aplicação ao início do aparecimento das larvas, antes da abertura das folhas.



ACTUALIZAÇÃO DA LISTA DE PROTECÇÃO INTEGRADA DE HORTÍCOLAS

FUNGICIDAS						
finalidade	substância activa	form	conc. g s.a/hl	CT	IS (dias)	Produto comercial
cercosporiose	bitertanol	SC	30	Xi;N	28	BAYCOR S
	carbendazime+flusilazol	SE	5+10-6,25+12,5	T;N	28	CONTRAST CS; PUNCH CS
	difenoconazol	EC	125g sa/ha	N	28	SCORE 250 EC
	difenoconazol+fenpropidina	EC	100+375g sa/ha (1)	Xn;N	28	SPYRALE 475 EC
	mancozebe	WP	160-240	Xi;N	28	FUNGITANE; MANCOZEBE SAPEC NUFOSEBE 80 WP (3); NUFOSEBE FLOW (3); MILTANE AZUL
	tetraconazol	ME	10 (1)	Is	35	EMINENT 125
ferrugem	bitertanol	SC	30	Xi;N	28	BAYCOR S
	carbendazime+flusilazol	SE	5+10-6,25+12,5	T;N	28	CONTRAST CS; PUNCH CS
	difenoconazol	EC	125g sa/ha	N	28	SCORE 250 EC
	difenoconazol+fenpropidina	EC	100+375g sa/ha (1)	Xn;N	28	SPYRALE 475 EC
	mancozebe	WP	160-240	Xi;N	28	FUNGITANE; MANCOZEBE SAPEC NUFOSEBE 80 WP (3); NUFOSEBE FLOW (3) MILTANE AZUL
	tetraconazol	ME	10 (1)	Is	35	EMINENT 125
ramulariose	carbendazime+flusilazol	SE	5+10-6,25+12,5	T;N	28	CONTRAST CS; PUNCH CS
	difenoconazol	EC	125g sa/ha	N	28	SCORE 250 EC
	difenoconazol+fenpropidina	EC	100+375g sa/ha (1)	Xn;N	28	SPYRALE 475 EC
	mancozebe	WP	160-240	Xi;N	28	FUNGITANE; MANCOZEBE SAPEC NUFOSEBE 80 WP (3); NUFOSEBE FLOW (3) MILTANE AZUL

Obs

- (1) – as aplicações devem ser iniciadas imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas e repetidas a intervalos de 3 semanas.
 (2) - as aplicações devem ser iniciadas imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas e repetidas a intervalos de 2 a 3 semanas, se necessário.
 (3) – as aplicações devem ser iniciadas imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas e repetidas a intervalos de 7 a 10 dias se as condições forem favoráveis ao aparecimento da doença.



ACTUALIZAÇÃO DA LISTA DE PROTECÇÃO INTEGRADA DE HORTÍCOLAS

HERBICIDAS (cont.)						
Substância activa	form	Dose (g s.a/ha)	CT	IS (dias)	Condições de aplicação	Produto comercial
paraquato ③	SL	300-1100	T;N	-	Monocotiledóneas e Dicotiledóneas Antes da instalação da cultura ou em pós-sementeira/plantação desde que a aplicação seja efectuada na entrelinha com recurso a campânulas para não atingir as culturas. Em solos arenosos efectuar a aplicação pelo menos 3 dias antes da emergência da cultura ou plantação.	GRAMOXONE 2000

Obs

(*) – alargamento de espectro para uso menor.

③ – substância activa considerada por não haver alternativa satisfatória.