



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

ARROZ

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
PERMISSÃO TEMPORÁRIA @
RECTIFICAÇÃO

FUNGICIDAS					
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Nome comercial	Classif.
helmintosporiose					
azoxistrobina (1)	SC	200-250	28	ORTIVA	N
piriculariose (<i>Piricularia oryzae</i>)					
azoxistrobina (2)	SC	200 – 250	28	ORTIVA	N
Obs. (1) Aplicar após o aparecimento dos primeiros sintomas; (2) Aplicar por pulverização antes da emergência das primeiras panículas, caso exista inoculo.					

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas						
cicloxidime	EC	200 (1)	---	Apenas para controlo do arroz-bravo. Aplicar antes da sementeira do arroz e com o arroz-bravo no estado de 1-2 folhas. (1) teor em s.a.100 g/L	FOCUS ULTRA	Xi
cihalofop-butilo	EC	300	---	Pós-emergência da cultura e com as milhãs com 1 - 3 folhas.	CLINCHER	Xn; N
molinato	FG	4500	---	Pré-sementeira com (incorporação), pré-emergência ou pós-emergência precoce, com o arroz e as milhãs com 2 folhas	ORDRAM	Xn; N
oxadiazão	EC	300-400	---	Aplicar a seguir à preparação do solo, alagando o terreno de seguida. A sementeira deve ser efectuada 5 a 7 dias após a aplicação.	RONSTAR	Xn; N

(cont.)



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

ARROZ

HERBICIDAS (cont.)						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas (cont.)						
proflumicazone	EC	100-150	---	Aplicar 100-120g das 4 folhas ao afilhamento do arroz. e 100-150g do início ao meio do afilhamento. Misturar o molhante DASH HC na dose de 0,75L/ha. Em aplicações de baixo volume a concentração de DASH HC não deve ultrapassar 0,5%.	AURA	C; N
monocotiledóneas (Gramíneas, Alismatáceas, Ciperáceas e Pontedereáceas) e dicotiledóneas						
azimsulfurão	WG	20-25	---	Aplicar em pós-emergência das 2-3 folhas até ao afilhamento do arroz. Com as infestantes gramíneas desde 2 folhas ao início do afilhamento e as outras infestantes até 4-6 folhas.	GULLIVER	N
bensulfurão-metilo	WG	51-60	---	Pós-emergência da cultura e as infestantes com 2 - 3 folhas.	LONDAX 60 DF	Is
bensulfurão-metilo + metsulfurão- metilo	WG	40+1,6 - 50+2	---	Aplicar em pós-emergência do arroz e quando as infestantes se encontram com 2-3 folhas. Não controla gramíneas.	PULL 52	Is
bentazona (sal de sódio)	SL	1440-2400	---	Pós-emergência, desde as 3 folhas ao afilhamento, e com as infestantes com 3-5 folhas.	BASAGRAN, KAOS, KAKURU	Xn; N
bispiribace-sódio	SC	25-30	---	Pós-emergência, desde as 3 folhas ao afilhamento, e com as milhãs no estado de 2 folhas ao início do afilhamento e as outras infestantes com 4 – 6 folhas.	NOMINEE	Xi; N
imazamox	SL	0,875L pc/ha em duas vezes, não ultrapassando a dose máxima de 1,75L/ha (correspondendo a 70 g s.a./ha)	---	Primeiro tratamento quando o arroz tiver 2-4 folhas (fase inicial das infestantes), segundo tratamento 2-3 semana mais tarde (início/meio do afilhamento)	PULSAR 40	N
MCPA(éster isocitílico)	SL	630-1050	---	Pós-emergência da cultura e com as infestantes em crescimento activo (4-6 folhas).	AGROCID; MCPA (ÉSTER) ORMENTAL (*); PRINTORMONA (*);	Xn
MCPA (sal de potássio)	SL	800-1200	---	Pós-emergência da cultura e com as infestantes em crescimento activo (4-6 folhas).	DIXEL(*); HERBITAL; HERBINEXA 40 K; HERBOFITAL 40; K 40; MESTRE K	Xn

(cont.)



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

ARROZ

HERBICIDAS (cont.)						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas (Gramíneas, Alismatáceas, Ciperáceas e Pontedereáceas) e dicotiledóneas						
penoxsulame	OD	40	---	Pós-emergência da cultura das 2-3 folhas até ao início do encanamento e com as infestantes com 1- 4 folhas.	VIPER	Xi; N
propanil (*)	EC	3600-9000	---	Pós-emergência da cultura e com as milhãs com 3-4 folhas. Utilizar as doses mais baixas em viveiros, e as mais altas em arroz semeado ou plantado	STAM F-34; RIZOMONDA 36; ORIZERBA	Xn; N
	SC	3360-4800 3360-8640			GEDRO; STAM NOVEL FLO 480; ORYZA 480 FLOW; ORYZA FL	Xn; N
	WG	3600-9000			ORYZA SUPRA W; STAM ULTRA D; SURCOPUR WG	Xn; N
marachas dos arrozais						
amitrol + tiocianato de amónio	SC	3,5-5L/ha	---	Aplicar após a ceifa do arroz quando as infestantes se encontram em pleno desenvolvimento vegetativo ou durante o ciclo da cultura em aplicações localizadas (com câpanula) sob as marachas infestadas.	ETIZOL TF	Xn
glifosato (sal de amónio)	SG	272-3600	---	Aplicar com as infestantes desenvolvidas, durante o ciclo da cultura, utilizando uma campânula ou após a ceifa.	BUGGY 360 SG; ROUNDUP FORTE	Xi; N
					TORNADO; TOUCHDOWN PREMIUM	Is
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	540 - 3600	---	Aplicar as doses mais baixas no controlo das infestantes anuais e as mais altas no controlo das vivazes	ARBONAL STAR 45; ASTERÓIDE; COSMIC; ENVISION 45; OXALIS; PITON VERDE; PREMIER 45 ENVISION; ROUNDUP ULTRA; ROUNDUP SUPRA	Is
					ACCELERATOR 45; CLINIC ACE; GLIFOS; GLIFOS ACCELERATOR; GLIFOSATO SAPEC; GLIFOSATO SELECTIS; GLYPHOGAN; MONTANA; PREMIER; RONAGRO	N
					BUGGY; GLIFOTOP; GLYPHOGAN (*); LOGRADO; NUFOSATE; RADIKAL; RAUDO; ROUNDUP; RUMBO VALLÉS; TOMCATO	Xi; N
					MARQUI	Xi

(cont.)



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

ARROZ

HERBICIDAS (cont.)						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
marachas dos arrozais						
glifosato (sal de potássio)	SL	240-720 (1) 720-1440 (2) 1440-1920 (3)	---	(1) Infestantes anuais nos primeiros estados de desenvolvimento, referidas no rótulo; (2) Infestantes anuais de folha larga ou estreita em desenvolvimento referidas no rótulo; (3) Infestantes perenes, referidas no rótulo.	SUPERSTING	Xi; N
Observ.: (*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).						

ALGAS DOS ARROZAIS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
cobre (sulfato)	XX	750-1875	7	Quando se observa a formação de algas aplicar por pulverização ou pela colocação de sacos de juta à entrada das regadeiras.	SULFATO DE COBRE CADUBAL; SULFATO DE COBRE COMBI; SULFATO DE COBRE CRISTAL SAPEC; SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*); SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*); SULFATO DE COBRE NEVE (*); SULFATO DE COBRE PARRA ; SULFATO DE COBRE VALLÉS (*); SULFATO DE COBRE VETLIMA	Xn; N
cobre (sulfato de cobre e cálcio)	WP	1700			BORDEAUX CAFFARO 13, CALDA BORDALESA QUIMAGRO; CALDA BORDALESA BAYER (*); CALDA BORDALESA CAFFARO 20	Xn; N
Observ.:						
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).						

Salienta-se ainda que:

- a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV's deverá ser consultada a listagem disponível no site em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos_lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).