DSPFSV/DABSV
ACT(PI-ARR) 02/2011

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• ARROZ •

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
PERMISSÃO TEMPORÁRIA Ⓟ
RECTIFICAÇÃO

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form	Dose (g s.a./ha)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	N.º Aplicações	Condições de Utilização
afídeos (*Aphididae* spp.)							
imidaclopride	SL	100 (500 ml/ha)	---	CONDOR • CORSÁRIO	N		Efectuar uma única aplicação entre o meio do afilhamento e até 40 dias antes da colheita.

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a./hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	N.º Aplicações	Condições de Utilização
helmintosporiose							
azoxistrobina (1)	SC	200-250	28	ORTIVA	N	máx. 1 aplic.	Aplicar após o aparecimento dos primeiros sintomas. (1) Realizar no máximo uma aplicação com fungicidas do grupo dos QoI.
piriculariose (*Piricularia oryzae*)							
azoxistrobina (1)	SC	200 – 250	28	ORTIVA	N	máx. 1 aplic.	Aplicar por pulverização antes da emergência das primeiras panículas, caso exista inóculo. (1) Realizar no máximo uma aplicação com fungicidas do grupo dos QoI.

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• ARROZ •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas						
cicloxidime	EC	200 (1) 400 (2)	---	(1) Infestantes anuais; (2) Infestantes vivazes. Para controlo do arroz-bravo, aplicar antes da sementeira e com o arroz-bravo no estado de 1-2 folhas (200 g s.a./ha).	FOCUS ULTRA	Xi
cihalofope-butilo	EC	300	---	Pós-emergência da cultura e com as milhãs com 1-3 folhas.	CLINCHER	Xn; N
molinato	FG	4500	---	Pré-sementeira com (incorporação), pré-emergência ou pós-emergência precoce, com o arroz e as milhãs com 2 folhas.	ORDRAM	Xn; N
oxadiazão	EC	300-400	---	Aplicar a seguir à preparação do solo, alagando o terreno de seguida. A sementeira deve ser efectuada 5 a 7 dias após a aplicação.	RONSTAR	Xn; N
profoxidime	EC	100-150	---	Aplicar das 4 folhas ao afilhamento do arroz (100-120g) e do início ao meio do afilhamento (100-150g). Misturar o molhante DASH HC na dose de 0,75L/ha. Em aplicações de baixo volume a concentração de DASH HC não deve ultrapassar 0,5%.	AURA	C; N
monocotiledóneas (Gramíneas, Alismatáceas, Ciperáceas e Pontedereáceas) e dicotiledóneas						
azimsulfurão	WG	20 - 25	---	Aplicar em pós-emergência do arroz (2-3 folhas ao afilhamento), as infestantes gramíneas com 1-2 folhas ao início do afilhamento e as outras infestantes até 4-6 folhas.	GULLIVER	N
bensulfurão-metilo	WG	51 - 60	---	Pós-emergência da cultura e as infestantes com 2-3 folhas.	LONDAX 60 DF	Is
bensulfurão-metilo + metsulfurão-metilo	WG	40+1,6 - 50+2	---	Aplicar em pós-emergência do arroz e quando as infestantes se encontram com 2-3 folhas. Não controla gramíneas.	PULL 52	Is
bentazona (sal de sódio)	SL	1440 - 1920	---	Pós-emergência, desde as 3 folhas ao afilhamento, e com as infestantes com 3-5 folhas.	BASAGRAN • KAOS • KAKURU	Xn; ~~N~~
bispiribace-sódio	SC	25 - 30	---	Pós-emergência, desde as 3 folhas ao afilhamento, e com as milhãs no estado de 1-2 folhas ao inicio do afilhamento e as outras infestantes com 4 – 6 folhas.	NOMINEE	Xi; N
imazamox	SL	0,875L pc/ha (em 2 aplic.) (3)	90	Primeiro tratamento quando o arroz tiver 2-4 folhas (fase inicial das infestantes), segundo tratamento 2-3 semana mais tarde (início/meio do afilhamento). (3) 0,875L pc/ha em 2 vezes, não ultrapassando a dose máxima de 1,75L/ha (correspondendo a 70 g s.a./ha).	PULSAR 40	N
~~MCPA (éster isooctílico)~~	~~SL~~	~~630 - 1050~~	~~---~~	~~Pós-emergência da cultura e com as infestantes em crescimento activo (4-6 folhas).~~	~~MCPA (ÉSTER) ORMENTAL • PRINTORMONA~~	~~Xn; N~~
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.						

cont.

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• ARROZ •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a./ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas (Gramíneas, Alismatáceas, Ciperáceas e Pontedereáceas) e dicotiledóneas						
MCPA (sal de potássio)	SL	800-1200	---	Pós-emergência da cultura e com as infestantes em crescimento activo (4-6 folhas).	AGROCIDE • DIXEL (*) • HERBITAL • HERBINEXA 40 K • HERBOFITAL 40 •K 40 •MESTRE K	Xn
oxadiazão	EC	300 - 400	---	Pré-sementeira. Aplicar após a última gradagem, alagando o terreno de seguida, a sementeira pode ser feita 2-3 a 6-7 dias após o tratamento.	RONSTAR	Xn; N
penoxsulame	OD	40	---	Pós-emergência da cultura (2-3 folhas ao início do encanamento) e as infestantes com 1-4 folhas.	VIPER	Xi; N
marachas dos arrozais						
amitrol + tiocianato de amónio	SC	840-1200 (3,5-5L/ha)	---	Aplicar após a ceifa do arroz quando as infestantes se encontram em pleno desenvolvimento vegetativo ou durante o ciclo da cultura em aplicações localizadas (com campânula) sob as marachas infestadas.	ETIZOL TL	Xn
glifosato (sal de amónio)	SG	720-3600	---	Aplicar com as infestantes desenvolvidas, durante o ciclo da cultura, utilizando uma campânula ou após a ceifa. Aplicar as doses mais baixas no controlo das infestantes anuais e as mais altas no controlo das vivazes.	BUGGY 360 SG	Xi
		272-3400	---		ROUNDUP FORTE	Xi; N
	SL	720-2520	---		TORNADO • TOUCHDOWN PREMIUM	Is
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	720 - 3600	---	Aplicar com as infestantes desenvolvidas, durante o ciclo da cultura, utilizando uma campânula ou após a ceifa. Aplicar as doses mais baixas no controlo das infestantes anuais e as mais altas no controlo das vivazes.	ARBONAL STAR 45 • ASTERÓIDE • COSMIC • ENVISION 45 • OXALIS • PITON VERDE • PREMIER 45 ENVISION • ROUNDUP ULTRA	Is
		270-3600			ROUNDUP SUPRA	
		720-3600			ACCELERATOR 45 • CLINIC ACE • GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • GLIFOSATO SAPEC • GLIFOSATO SELECTIS •GLOSATO • GLYPHOGAN AV0163 • MONTANA • PREMIER • RONAGRO	N
					BUGGY • GLIFOTOP • GLYPHOGAN (*) AV0055 • LOGRADO • NUFOSATE • RADIKAL • RAUDO • ROUNDUP • RUMBO VALLÉS • TOMCATO	Xi; N
					GLIFOPEC • MARQUI • MARQUI II	Xi
glifosato (sal de potássio)	SL	240-720 (4) 720-1440 (5) 1440-1920 (6)	---	(4) Infestantes anuais nos primeiros estados de desenvolvimento; (5) Infestantes anuais em desenvolvimento; (6) Infestantes perenes.	SUPERSTING	Xi; N
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.						

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

• ARROZ •

ALGAS DOS ARROZAIS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a./ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
cobre (sulfato)	XX	1250-5000	---	Quando se observa a formação de algas aplicar por pulverização ou pela colocação de sacos de juta à entrada das regadeiras.	SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE COMBI • SULFATO DE COBRE CRISTAL SAPEC • SULFATO DE COBRE CRYSTAL APV3976 (*) • ~~SULFATO DE COBRE MACKECHNIE APV2117~~ • ~~SULFATO DE COBRE NEVE APV2205~~ • SULFATO DE COBRE NEVE APV3935 (*) • ~~SULFATO DE COBRE VALLÉS APV3755~~	Xn; N
cobre (sulfato de cobre e cálcio)	WP	1700			BORDEAUX CAFFARO 13 • CALDA BORDALESA QUIMAGRO • ~~CALDA BORDALESA BAYER~~	Xn; N
(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.						

Nota:

- a consulta destes quadros não dispensa a **leitura atenta do rótulo** do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao **cancelamento de AVs e APV`s** deverá ser consultada a listagem disponível no site em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).