

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL PERMISSÃO TEMPORÁRIA ® RECTIFICAÇÃO

• PRADOS DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS •

	FUNGICIDAS									
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	N.º Aplicações	Condições de Utilização			
	podridão do colo (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)									
Coniothyrium miniotans (3)	WG	2 Kg p.c./ha		CONTANS WG	ls		(3) Fungicida biológico. Antes da instalação da cultura e em pós- sementeira ou pós-emergência da cultura.			

				HERBICIDAS		
Substância activa			Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.	
				dicotiledóneas		
2,4-D+MCPA (sais de dimetilamónio)	SL	665 - 840 (1) 210 - 385 (2)		(1) Prados de gramíneas (infestantes 4-6 folhas). (2) Prados de leguminosas (trevo branco). Não aplicar em luzerna ou sanfeno.	HERBOFITAL COMBI • U 46 COMBI FLUID	Xn
asulame	SL	1600 - 4400	14 (3)	Aplicar só para o controlo de labaças (Rumex spp.) ou fetos (<i>Pteridium aquilinum</i>) em prados estabelecidos e ou degradados. As labaças devem estar no estado de roseta e os fetos com 3 pares de segmentos inferiores da folha expandidos. (3) Intervalo que medeia entre a aplicação e o corte da pastagem e ou pastoreio.	ASULOX	Xi;N
fluroxipir – 1MHE	EC	300 - 400 (1,5 - 2L/ha)	_	Controlo de infestantes dicotiledóneas em prados de gramíneas, desde 3 folhas da gramínea.	STARANE 20 • TOMAHAWK	Xn; N
MCPA (sal de potássio)	SL	600 - 2000 (1) 300 - 500 (2)		(1) Prados de gramíneas (infestantes 4-6 folhas).(2) Prados de leguminosas (após o corte).Não se recomenda para luzerna e sanfeno.	DIXEL (*) ● HERBITAL ● HERBINEXA 40 K ● HERBOFITAL 40 ● K 40 ● MESTRE K	Xn

Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa, no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.

(*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dgadr.pt.



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

PASTAGENS •

	FUNGICIDAS									
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	N.º Aplicações	Condições de Utilização			
	podridão do colo (Sclerotinia sclerotiorum)									
Coniothyrium miniotans (3)	WG	2 Kg p.c./ha		CONTANS WG	ls		(3) Fungicida biológico. Antes da instalação da cultura e em pós- sementeira ou pós-emergência da cultura.			

	HERBICIDAS								
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.			
	dicotiledóneas								
asulame	SL	1600 - 4400	14 (1)	Aplicar só para o controlo de labaças (Rumex spp.) ou fetos (<i>Pteridium aquilinum</i>) em prados estabelecidos e ou degradados. As labaças devem estar no estado de roseta e os fetos com 3 pares de segmentos inferiores da folha expandidos. (1) Intervalo que medeia entre a aplicação e o corte da pastagem e ou pastoreio.	ASULOX	Xi;N			



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

• PASTAGENS (Renovação)•

	HERBICIDAS									
Substância activa	Form	Dose (g s.a./ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.				
	monocotiledóneas e dicotiledóneas									
glifosato	SG	270 - 3600		Quando as infestantes se	BUGGY 360 SG	Xi				
(sal de amónio)		272 - 3400		encontram em crescimento activo.	ROUNDUP ◆ ROUNDUP FORTE	Xi; N				
glifosato (sal de		ROUNDUP SUPRA								
isopropilamónio)		720 - 3600			ARBONAL STAR 45 ◆ ASTERÓIDE ◆ COSMIC ◆ ENVISION 45 ◆ PITON VERDE ◆ PREMIER 45 ENVISION • ROUNDUP ULTRA ◆ ROUNDUP SUPRA ◆ OXALIS					
				ACCELERATOR 45 • CLINIC ACE • GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • GLIFOSATO SAPEC • GLIFOSATO SELECTIS • GLOSATO • GLYPHOGAN (AV 0163) • MONTANA • PREMIER	N					
					BUGGY • GLIFOTOP • GLYPHOGAN (AV 0055) (*) • LOGRADO • NUFOSATE • RADIKAL • RAUDO • RONAGRO • ROUNDUP • RUMBO VALLÉS • TOMCATO	Xi; N				
					GLIFOPEC • MARQUI • MARQUI II	Xi				



ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA DE PASTAGENS E FORRAGENS

CULTURAS NÃO ESPECIFICADAS •

MOLUSCICIDAS									
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / ha)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Condições de Utilização			
metiocarbe	GB	120 g s.a./ha (80 grāos/m²) 120 g s.a./ha (20 iscos/m²)	(1)	DRAZA (*) MESUROL ANTILESMA	Xn; N	Não utilizar caracóis mortos na alimentação humana ou animal. Espalhamento manual ou mecânico em cultura extensiva. (1) Não aplicar junto de culturas comestíveis a menos de			
(*) Consultar a li	três semanas da colheita. (*) Consultar a lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR em www.dqadr.pt.								

Nota:

- a consulta destes quadros não dispensa a **leitura atenta do rótulo** do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV's deverá ser consultada a listagem disponível no site em www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).