



DSPFSV/DABSV
ACT(PI-PRUN)02/11

ACTUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ACONSELHADOS EM PROTECÇÃO INTEGRADA

INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
EXCLUSÃO DE SUBSTÂNCIA ACTIVA E NOME COMERCIAL
PERMISSÃO TEMPORÁRIA ®
RECTIFICAÇÃO

• AMEIXEIRA •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form.	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
formas hibernantes de insectos e ácaros (tratamento de Inverno)							
óleo de Verão	EC	2739-4000	---	GARBOL	N	--	--
				TOLFIN	Is		
	EO	3200-4000	---	SOLEOL • VEROL • POMOROL	Is		
ácaros							
abamectina ® (7)	EC	1,35	28	VERTIMEC 018 EC (1)	Xn; N	máx. 1 aplic.	(1) Alargamento de espectro para USO MENOR, para ácaros (<i>Panonychus ulmi</i> e <i>Tetranychus urticae</i>). (7) A utilizar só até ao mês de Abril, ou se ocorrer antes, até à queda das pétalas (estado fenológico G-H, escala de Fleckinger).
afídeos							
acetamiprida ® (5)	SP	5	14	EPIK • GAZELLE	Xn; N	máx. 2 aplic. (5)	(5) Grupo neonicotinóides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável.
	SG	5	14	EPIK SG • GAZELLE SG	Xn; N		
tiaclopride ® (5)	SC	72-96g s.a./ha	14	CALYPSO	Xn; N	máx. 2 aplic. (5)	
tiametoxame ® (5)	WG	2,5	14	ACTARA 25 WG	N	máx. 2 aplic. (5)	
ácaros tetraníquídeos (aranhão vermelho)							
spirodiclofena ® (8)	SC	72-96	14	ENVIDOR	Xn; N	máx. 1 aplic. (8)	(8) Máximo 1 aplicação por ciclo cultural e para o conjunto das finalidades.
bichado da fruta (<i>Cydia frunebana</i>)							
clorpirifos ®	EC	72-96	21	DURBAN 4 (2)	Xn; N	máx. 2 aplic.	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR.
fenoxicarbe	WG	10	21	INSEGAR 25 WG (2)	N	máx. 3 aplic.	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR.



• AMEIXEIRA (Cont.) •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form.	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
cochonilhas							
óleo de Verão	EO	800-1600	---	SOLEOL • 7 • POMOROL	Is		
cochonilha de São José (<i>Quadropsidiotus perniciosus</i>)							
óleo de Verão	EO	800-1600	--	VEROL • GARBOL	Is		(9) Tratar entre o estado B (entumescimento dos gomos) e E ₃ (desabrochar).
clorpirifos ®	EC	72-96	21	RISBAN 48 EC (2)	Xn; N	máx. 2 aplic.	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR.
mosca do Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
lambda-cialotrina ®	CS	1,25	7	KARATE with ZEON technology • NINJA with ZEON technology (3) • ATLAS • JUDO	Xn; N	máx. 2 aplic.	(3) Efectuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Aplicar em filas alternadas e adicionar atractivo alimentar.
lufenurão	RB	24 iscos/ha	---	ADRESS	N		
tripes (incluindo <i>Frankliniella occidentalis</i>)							
acrinatrina ®	EW	4,5-7,5	14	RUFAS AVANCE (4)	N	máx. 2 aplic.	(4) Aplicar ao aparecimento da praga.
Obs. ® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e ciclo cultural, quando aplicável.							



• AMEIXEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
cancro (<i>Fusicoccum</i> spp.)							
tirame (1) (**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar no início, meio e fim da queda das folhas e repetir ao entumescimento dos gomos. (1) Não efectuar mais de 3 aplicações
	WP			FERNIDE WP			
crivado							
captana	WG	144-192	21	MERPAN 80 WG	Xn; N	--	Tratar imediatamente antes da floração, à queda das pétalas e 10-15 dias mais tarde.
	WP	150-200	21	CAPTAN • MALVIN 83 WP	Xn; N		
cobre (hidróxido) (2) (3)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*)• VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Tratamento à queda da folha, com a concentração mais elevada. Tratar no estado B-C com a concentração mais baixa. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (2) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (3) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125- 250	7	GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO-ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (3)	WP	200 -500	7	BLAURAME • CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAMBLU • ULTRA COBRE	Xn	--	
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	105-500	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• AMEIXEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado (cont.)							
cobre (oxicloreto) (3)	SC	125 – 501	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn	--	Tratamento à queda da folha, com a concentração mais elevada. Tratar no estado B-C com a concentração mais baixa. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
cobre (sulfato) (3)	XX	250 -500	7	CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
				SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE DE COBRE MACKECHNIE(*) • SULFATO DE COBRE NEVE(*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (3)	SC	247	7	CUPROXAT	N		(3) Nunca aplicar após a rebentação
mancozebe (4)(**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOSEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (1) (**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar à queda das folhas, ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto.
	WP	160-240		FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (1) (**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N		(1) Não efectuar mais de 3 aplicações

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• AMEIXEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
lepra							
cobre (hidróxido) (2) (3)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE DF • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS(*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Tratamento à queda da folha, com a concentração mais elevada. Tratar no estado B-C com a concentração mais baixa. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (2) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (3) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125- 250	7	GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (3)	WP	200 -500	7	BLAURAME • CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn	--	Tratamento à queda da folha, com a concentração mais elevada. Tratar no estado B-C com a concentração mais baixa. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (3) Nunca aplicar após a rebentação.
				COBRE 50 SELECTIS •EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	105-500	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
	SC	125 – 501	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC •INACOP-L •CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
cobre (sulfato) (3)	XX	250 -750	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N	--	Tratamento à queda da folha, com a concentração mais elevada. Tratar no estado B-C com a concentração mais baixa. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (3) Nunca aplicar após a rebentação.
cobre (sulfato Cu tribásico) (3)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							



• AMEIXEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
lepra (cont.)							
enxofre	WG	240-320 (5) 160-240 (6)	---	STULLN ADVANCE STULLN WG ADVANCE	Is	--	(5) Tratamento antes da floração.
	WP	240-320 (5) 160-240 (6)	---	COSAN WP	Xi		(6) Tratamento após a floração.
				ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN	Is		
	SC	240-325 (5) 160-240 (6)	---	SUFREVIT • HEADLAND SULPHUR	Is		
				ENXOFRE FLOW SELECTIS • LAINXOFRE L • VISUL	Xi		
tirame (1)(**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAMÉ 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar à queda das folhas, ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto.
	WP	160- 240	14	FERNIDE WP	Xn; N		(1) Não efectuar mais de 3 aplicações
zirame (1) (**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(1) Não efectuar mais de 3 aplicações
moniliose							
bitertanol	SC	30	7	BAYCOR S	Xi; N		
boscalide (7)	WG	20	3	CANTUS	N	máx. 2 aplic. (7)	(7) Realizar no máximo 2 aplicações com fungicidas do grupo SDHI.
cobre (hidróxido) (3)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*)• VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Tratar ao entumescimento dos gomos (estado B-C). Os Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (3) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250	7	GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (3)	WP	200-210	7	CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn	--	
				COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50	Xn; N		
				IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
	WG	157-200		NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
				COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
	SC	207-210	7	INACOP-L	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• AMEIXEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
cobre (sulfato) (3)	XX	250 Cu	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL(*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE(*) • SULFATO DE COBRE NEVE(*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS(*)	Xn; N	--	(3) Nunca aplicar após a rebentação.
cobre (sulfato de cobre tribásico) (3)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
enxofre	WG	240-320 (5) 160-240 (6)	--	STULLN-ADVANCE STULLN WG ADVANCE	Is	--	(5) Tratamento antes da floração.
	WP	240-320 (5) 160-240 (6)	---	COSAN WP	Xi		(6) Tratamento após a floração.
			---	ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN	Is		
	SC	240-325 (5) 160-240 (6)	---	HEADLAND SULPHUR	Is		
			---	COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX • VISUL	Xi		
fenebuconazol (9)	EW	5	3	INDAS 5 EW (8)	Xi; N	máx. 2 aplic. (9)	(8) Alargamento de espectro para USO MENOR. (9) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares).
mancozebe (4) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto enquanto se mantiverem condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença. (4) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOZEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (1) (**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto enquanto se mantiverem condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença.
	WP	160-240	14	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (1) (**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• AMEIXEIRA (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas						
fluazifope - P-butilo	EC	250-375	7	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo.	CAMPUS TOP • FUSILADE MAX • MONARK	Xi; N
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
amitrol	SG	1720 a 2580 (1) 2580 (2)	--	(1) dicotiledóneas em desenvolvimento e gramíneas até ao afilamento. (2) dicotiledóneas desenvolvidas e gramíneas até ao encanamento.	CARAMBA • MAXATA	Xn; N
diiflufenicão + glifosato	SC	240+960- -320+1280		Após a emergência das infestantes. Não aplicar em pomares com menos de 4 anos. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ALIADO • FUJI • TRONX SUPER • ZARPA •	Xi
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	720-3600	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar junto de árvores que apresentem clorofila nos caules (cor verde). Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ASTERÓIDE • PREMIER 45 ENVISION	Is
					GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • PREMIER • MONTANA	N
					RAUDO	Xi; N
					ACCELERATOR 45 • ARBONAL STAR 45 • ENVISION 45	Is
glufosinato de amónio ®	SL	450-1500	---	Após a emergência das infestantes, quando estas se encontram em crescimento activo. Nas infestantes vivazes destrói temporariamente a parte aérea. Não atingir folhas, ramos e frutos.	BASTA S	Xn
Obs.						
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e ciclo cultural, quando aplicável.						



● AMEIXEIRA (Cont.) ●

REGULADORES DE CRESCIMENTO DE PLANTAS						
Substância activa	Objectivos de utilização e épocas de aplicação	Form	Concentração (sa / pc)	IS Dias	Nome comercial	Classif.
1-metilciclopropeno	Regulação do processo de maturação; inibição da acção de etileno e preservação da firmeza da polpa. Tratamento na câmara frigorífica, imediatamente após a colheita, no máximo nos 7 dias seguintes. Número máximo de aplicações: 1	VP	43 mg p.c/ m ³ 1,42 mg s.a./m ³	-	SMARTFRESH (1)	IS
Obs. (1) Alargamento de espectro para USO MENOR.						

• CEREJEIRA •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS								
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização	
formas hibernantes de insectos e ácaros (tratamento de Inverno)								
óleo de Verão	EC	2739-4000	---	GARBOL	N	--		
	EO	3200-4000	---	OLEOFIX • SOLEOL • VEROL • POMOROL	Is			
				KLIK 80	N			
	EW	3200-4000	---	FITANOL	N			
afídeos								
acetamiprida ® (3)	SP	5	14	EPIK • GAZELLE	Xn; N	máx. 2 aplic. (3)	(3) Grupo neonicotinóides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável.	
	SG	5	14	EPIK SG • GAZELLE SG	Xn; N			
imidaclopride (3)	SL	10	21	CONDOR • CONFIDOR CLASSIC • COURAZE • SOLAR • KOHINOR 20 SL • MASTIM • CORSÁRIO • NUPRID 200 SL • NEOMAX • WARRANT 200 SL	N	máx. 2 aplic. (3)		
	OD	10,3	21	CONFIDOR O-TEQ	Xi; N			
	WG	10,5	21	COURAZE WG	Xn; N			
tiaclopride (3)	SC	9,6	14	CALYPSO	Xn; N	máx. 2 aplic. (3)		
tiametoxame ® (3)	WG	2,5	14	ACTARA 25 WG	N	máx. 2 aplic. (3)		
aranhão vermelho (Panonychus ulmi)								
bifentrina ®	EC	6-8 (1)	7	TALSTAR (*)	Xn; N	máx. 2 aplic.	(1) Utilizar a concentração mais elevada no caso de grandes infestações.	
cochonilhas								
óleo de Verão	EO	800-1600	---	OLEOFIX • POMOROL • SOLEOL • VEROL	Is	--		
cochonilha de São José (Quadropsidiotus perniciosus)								
óleo de Verão	EO	800-1600	--	VEROL • GARBOL	Is			
mosca da cereja								
deltametrina ®	EC	1,25	7	DECIS • DELTAPLAN	Xn; N	máx. 2 aplic.		
mosca do Mediterrâneo(Ceratitis capitata)								
lufenurão	RB	24 iscos/ha	---	ADRESS	N			
traça da cereja (Cheimatobia brumata)								
lambda-cialotrina ®	CS	1,5	14	KARATE with ZEON technology (2)	Xn; N	máx. 2 aplic.	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR.	
tripes								
acrinatrina ®	EW	4,5-7,5	14	RUFAS AVANCE (2) (5)	N	máx. 1 aplic.	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR. (5) Aplicar ao aparecimento da praga.	
Obs.								
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e ciclo cultural, quando aplicável.								
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).								



• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
antracnose							
dodina	WP	52-65	14	SYLLIT 65 WP • DODIVAL	Xn; N		
	SC	52-64,8	14	SYLLIT 400 SC	Xi; N		
cancro bacteriano (<i>Pseudomonas</i> spp.)							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	12-105	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N		Efectuar três tratamentos, respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
				COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	15-125	7	GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • CHAMPION WP • COBRE HIDRÓXIDO — ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	300	7	• CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • ULTRA COBRE	Xn		
				COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	300	7	CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
	SC	317-350	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
cobre (sulfato) (2)	XX	250-500 Cu	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N		Efectuar três tratamentos, respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
cobre (sulfato de cobre tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (<i>produtos fitofarmacêuticos</i> _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							



• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	For m	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
cilindrosporiose (<i>Cylindrosporium padi</i>)							
mancozebe (3) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	FUNGITANE (*) • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE M-45 • MANCOZEBE SELECTIS •	Xi; N		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*)	Xi; N		
crivado							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG• KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	—	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
		100-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO-ADP-FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200 – 500	7	BLAURAME • CALLICOBRE 50 WP • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn		(1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	SC	125 - 500		COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
	WG	105-500		IPERION WG•NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado (cont.)							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
		100-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE - HIDRÓXIDO - ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200 – 500	7	BLAURAME • CALICOBRE 50 WP • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn	--	(1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	SC	125 - 500		COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
	WG	105-500		IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
cobre (sulfato) (2)	XX	250 - 500	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL(*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE(*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		(2) Nunca aplicar após a rebentação.
mancozebe (3)(**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar à queda das folhas, ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto. (3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOSEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado (cont.)							
tirame (4) (**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	14	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4) (**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
lepra							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250	7	GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE-HIDRÓXIDO-ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-500	7	BLAURAME • CALICOBRE 50 WP • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn		Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	105-500	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
	SC	125-501	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.

(Cont.)

• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
lepra (cont.)							
cobre (sulfato) (2)	XX	250 - 750	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N	--	Tratar à queda da folha e repetir ao entumescimento dos gomos. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
enxofre	WG	240-320 (5) 160-240 (6)	--	STULLN ADVANCE STULLN WG ADVANCE	Is	--	Em condições favoráveis à doença tratar desde o entumescimento dos gomos até ao vingamento do fruto. (5) Tratamento antes da floração. (6) Tratamento após a floração.
	WP	240-320 (5) 160-240 (6)	---	COSAN WP ENXOFRE MOLHÁVEL CC • ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN	Xi Is		
	SC	240-325 (5) 160-240 (6)	---	HEADLAND SULPHUR COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX • VISUL	Is Xi		
tirame (4) (**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAMÉ 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	14	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4) (**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	
moniliose							
bitertanol	SC	30	14	BAYCOR S	Xi; N	--	--
boscalide (7)	WG	20	3	CANTUS	N	máx. 2 aplic.	(7) Realizar no máximo 2 aplicações com fungicidas do grupo SDHI.
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Tratamento ao entumescimento dos gomos. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250	7	GYPSE 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO-ADP-FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-210	7	CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn	--	
				COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	157-200	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
	SC	207-210	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
cobre (sulfato) (2)	XX	250	7	FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N	--	
				SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N	--	
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							



• CEREJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
enxofre	WG	240-320 (5) 160-240 (6)	--	STULLN ADVANCE • STULLN WG ADVANCE	Is	--	Tratar ao entumescimento dos gomos, início da floração, queda das pétalas e vingamento do fruto, repetir se necessário. (5) Tratamento antes da floração. (6) Tratamento após a floração.
	WP	240-320 (5) 160-240 (6)	---	COSAN WP	Xi		
				ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN	Is		
	SC	240-325 (5) 160-240 (6)	---	HEADLAND SULPHUR	Is		
fenebuconazol	EW	5	3	COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX • VISUL	Xi	máx. 2 aplic. (9)	(8) Alargamento de espectro para USO MENOR. (9) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares).
				INDAS 5 EW (8)	Xi; N		
mancozebe (3) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto enquanto se mantiverem condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença. (3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOSEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (4)(**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM - 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	14	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4)(**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• CEREJEIRA (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas						
fluazifope - P-butilo	EC	250-375	7	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo.	CAMPUS TOP • FUSILADE MAX • MONARK	Xi; N
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
amitrol	SG	1720 a 2580 (1) 2580 (2)	---	(1) dicotiledóneas em desenvolvimento e gramíneas até ao afilamento. (2) dicotiledóneas desenvolvidas e gramíneas até ao encanamento.	CARAMBA • MAXATA	Xn; N
amitrol+tiocianato de amónio	SC	960+860- -1440+1290	---	Aplicar após a emergência das infestantes, de preferência no período de maior crescimento activo.	ETIZOL TL • TRIVIAL	Xn
diflufenicão + glifosato	SC	240+960- -320+1280	---	Após a emergência das infestantes. Não aplicar em pomares com menos de 4 anos. Não atingir as partes verdes da cultura.	ALIADO • FUJI • TRONX SUPER • ZARPA	Xi
glifosato (sal de amónio)	SG	272-3600	28	Após a emergência das infestantes quando estas se encontram em crescimento activo. Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Não aplicar junto de árvores que apresentem clorofila nos caules (cor verde). Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	BUGGY 360 SG • ROUNDUP FORTE	Xi; N
	SL	720-2520			TOUCHDOWN PREMIUM • TORNADO	Is
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	540-3600 (a)	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Não aplicar junto de árvores que apresentem clorofila nos caules (cor verde). Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos. (a) Teor em substância activa de 180 e 360 g/l	ASTERÓIDE • PREMIER 45 ENVISION • COSMIC • ROUNDUP ULTRA • ROUNDUP SUPRA • OXALIS • GLYPHOGAN (AV 0163)	Is
					MARQUI • GLIFOPEC	Xi
					CLINIC ACE • 360 G • GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • GLIFOSATO SAPEC • GLIFOSATO SELECTIS • MONTANA • PITON VERDE • PREMIER	N
					RONAGRO • BUGGY • GLYPHOGAN (AV 0055)(*) • GLIFOTOP • LOGRADO • NUFOSATE • RADIKAL • RAUDO • ROUNDUP • RUMBO VALLÉS • TOMCATO	Xi; N
					ACCELERATOR 45 • ARBONAL STAR 45 • ENVISION 45	Is



• CEREJEIRA (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas e dicotiledóneas (cont.)						
glifosato (sal de potássio)	SL	270-2160	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Não aplicar junto de árvores que apresentem clorofila nos caules (cor verde). Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ROUNDUP BRONCO	N
					SUPER STING • ROUNDUP GPS	Xi; N
glufosinato de amónio ®	SL	450-1500	---	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Nas infestantes vivazes destrói temporariamente a parte aérea. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	BASTA S	Xn
Obs.						
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.						



• DAMASQUEIRO •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
formas hibernantes de insectos e ácaros (tratamento de Inverno)							
óleo de Verão	EC	2739-4000	---	GARBOL	N		
	EO	3200-4000	---	OLEOFIX • SOLEOL • VEROL • POMOROL	Is		
ácaros e aranhicho amarelo							
spirodiclofena ® (1)	SC	72-96	14	ENVIDOR	Xn; N	máx. 1 aplic. (1)	(1) Máximo 1 aplicação por ciclo cultural , para o conjunto das finalidades.
afídeos (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A. spiraecola</i> , <i>Brachycaudus prunicola</i> e <i>Myzus persicae</i>)							
tiaclopride ® (4)	SC	7,2-9,6	14	CALYPSO (2)	Xn; N	máx. 2 aplic. (4)	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR, para os afídeos <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. spiraecola</i> , <i>Brachycaudus prunicola</i> e <i>Myzus persicae</i> . (4) Grupo neonicotinoides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável.
bichado da fruta							
tiaclopride ® (4)	SC	7,2-9,6	14	CALYPSO (2)	Xn; N	máx. 2 aplic. (4)	(2) Alargamento de espectro para USO MENOR bichado da fruta (<i>Cydia pomonella</i>). (4) Grupo neonicotinoides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável.
cochonilhas							
óleo de Verão	EO	700-1600	---	OLEOFIX • SOLEOL • VEROL • POMOROL	Is		
Adoxophyes orana							
Indoxacarbe (6)	WG	4,95	7	EXPLICIT WG • STEWARD	Xn; N	máx. 4 aplic. (6)	(6) Para evitar o desenvolvimento de resistências, aconselha-se máximo de 4 aplicações por ciclo cultural.
anársia (Anarsia lineatella)							
Indoxacarbe (6)	WG	4,95	7	EXPLICIT WG • STEWARD	Xn; N	máx. 4 aplic. (6)	(6) Para evitar o desenvolvimento de resistências, aconselha-se máximo de 4 aplicações por ciclo cultural.
traça oriental (Grapholita molesta) Ω							
Indoxacarbe (6)	WG	4,95	7	EXPLICIT WG • STEWARD	Xn; N	máx. 4 aplic. (6)	(6) Para evitar o desenvolvimento de resistências, aconselha-se máximo de 4 aplicações por ciclo cultural.
Obs.							
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.							



• DAMASQUEIRO (Cont.) •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
mosca do Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
fosmete (5)	WP	50	14	IMIDAN 50 WP	Xn; N	máx. 2 aplic (5)	(5) Realizar no máximo duas aplicações por ciclo cultural.
lambda-cialotrina [®]	CS	1,25	7	KARATE with ZEON technology • NINJA with ZEON technology (3) • JUDO • ATLAS	Xn; N	máx. 2 aplic.	(3) Efectuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Aplicar em filas alternadas e adicionar atractivo alimentar.
lufenurão	RB	24 iscos/ha	---	ADRESS	N		
Obs.							
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.							



• DAMASQUEIRO (Cont.)•

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado							
captana	WG	144-192	21	MERPAN 80 WG	Xn; N	--	Tratar imediatamente antes da floração, à queda das pétalas e 10-15 dias mais tarde.
	WP	150-200	21	CAPTAN • MALVIN 83 WP	Xn; N		
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE-HIDRÓXIDO-ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200 - 500	7	• CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • ULTRA COBRE	Xn	--	
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	112-500	7	CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
	SC	140-490	7	CUPROCOL • CUPRITAL SC • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
cobre (sulfato) (2)	XX	250-500	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							



• DAMASQUEIRO (Cont.)•

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado (cont.)							
mancozebe (3) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar à queda das folhas, ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto. (3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOZEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (4)(**)	WG	160-240	14 42	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAMÉ 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar à queda das folhas, ao entumescimento dos gomos e repetir até ao vingamento do fruto. (4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240		FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4)(**)	WG	133-178,6	--	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Aplicar só até ao fim da floração. Não efectuar mais de 3 aplicações.
moniliose							
bitertanol	SC	30	7	BAYCOR S	Xi; N		---
boscalide (7)	WG	20	3	CANTUS	N	máx. 2 aplic. (7)	(7) Realizar no máximo 2 aplicações com fungicidas do grupo SDHI.
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO-ADP.FITOCOBRE	Xn; N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							

• **DAMASQUEIRO (Cont.)** •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-210	7	CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU	Xn	--	Tratar no estado B-C (entumescimento dos gomos). Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com fungicidas cúpricos. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes.
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	157-200	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
	SC	207-210	7	CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
				COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
cobre (sulfato) (2)	XX	250	7	CUPROCOL • CUPRITAL SC • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N	--	(2) Nunca aplicar após a rebenção.
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N	--	
enxofre	SC	240-325 (5) 160-240 (6)	--	HEADLAND SULPHUR	Is	--	(5) Tratamento antes da floração. (6) Tratamento após a floração.
				COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX • VISUL	Xi		
mancozebe (3)(**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M- 45 • • FUNGÈNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
	SC	159	28	MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOZEBE 80 WP DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi		

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contém ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• DAMASQUEIRO (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
tirame (4)(**)	WG	160-240	44 42	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240		FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4)(**)	WG	133-178,6	--	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Aplicar só até ao fim da floração. Não efectuar mais de 3 aplicações.
oídio							
biteranol	SC	25-30	7	BAYCOR S	Xi; N	--	Tratamento a efectuar após a floração ao aparecimento dos primeiros sintomas.
enxofre	WP	160-320	---	COSAN WP	Xi	--	Tratamento a efectuar após a floração ao aparecimento dos primeiros sintomas. As concentrações mais elevadas destinam-se ao tratamento imediatamente após a floração, prosseguindo as aplicações com as concentrações mais baixas.
				ENXOFRE MOLHÁVEL CC • ENXOFRE MOLHÁVEL EPAGRO (*) ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN • ENXOFRE MOLHÁVEL ORIENTAL	Is		
	SC	160-400	---	SUFREVIT • HEADLAND SULPHUR	Is		
				STULLN FL • COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX • VISUL	Xi		
	WG	160-320		THIOVIT JET • ENXOFRE PALLARÉS 80 WG • ENXOFRE MICRONIZADO AGROQUISA • ALASCA MICRO	Xi		
				COSAN WDG • KUMULUS S • STULLN ADVANCE – STULLN WG ADVANCE • MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS	Is		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contém ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• DAMASQUEIRO (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas						
fluazifope - P-butilo	EC	250-375	7	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo.	CAMPUS TOP • FUSILADE MAX • MONARK	Xi; N
quizalofope-P-etilo	EC	50-150	---	Após a emergência das infestantes.	TARGA GOLD	Xn; N
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
amitrol	SG	1720 a 2580 (1) 2580 (2)	---	(1) dicotiledóneas em desenvolvimento e gramíneas até ao afilamento. (2) dicotiledóneas desenvolvidas e gramíneas até ao encanamento.	CARAMBA • MAXATA	Xn; N
amitrol+tiocianato de amónio	SC	960+860- -1440+1290	---	Aplicar após a emergência das infestantes, de preferência no período de maior crescimento activo.	ETIZOL TL • TRIVIAL	Xn
diflufenicão + glifosato	SC	240+960- -320+1280	---	Após a emergência das infestantes. Não aplicar em pomares com menos de 4 anos. Não atingir as partes verdes da cultura.	ALIADO • FUJI • TRONX SUPER • ZARPA	Xi
glifosato (sal de amónio)	SG	272-3600	28	Após a emergência das infestantes quando estas se encontram em crescimento activo. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	BUGGY 360 SG • ROUNDUP FORTE	Xi; N
	SL	720-2520	28	Após a emergência das infestantes quando estas se encontram em crescimento activo. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	TOUCHDOWN PREMIUM • TORNADO	Is
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	540-3600 (a)	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Não aplicar junto de árvores que apresentem clorofila nos caules (cor verde). Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos. (a) Teor em substância activa de 180 e 360 g/l	ASTERÓIDE • PREMIER 45 ENVISION • COSMIC • ROUNDUP ULTRA • ROUNDUP SUPRA • OXALIS • GLYPHOGAN (AV 0163)	Is
					MARQUI • GLIFOPEC	Xi
					CLINIC ACE • 360 G • GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • GLIFOSATO SAPEC • GLIFOSATO SELECTIS • MONTANA • PITON VERDE • PREMIER	N
					RONAGRO • BUGGY • GLYPHOGAN (AV 0055)(*) • GLIFOTOP • LOGRADO • NUFOSATE • RADIKAL • RAUDO • ROUNDUP • RUMBO VALLÉS • TOMCATO	Xi; N
					ACCELERATOR 45 • ARBONAL STAR 45 • ENVISION 45	Is



• DAMASQUEIRO (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
glifosato(sal de potássio)	SL	270-2160	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em vinhas e pomares com menos de 3 anos. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ROUNDUP BRONCO	N
					SUPER STING • ROUNDUP GPS	Xi; N
glufosinato de amónio®	SL	450-1500	---	Em pós-emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Nas infestantes vivazes destrói apenas temporariamente a parte aérea. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	BASTA S	Xn
pendimetalina	CS	1137 - 1365	---	Aplicar desde o final da colheita até ao vingamento dos frutos. Não atingir ramos e folhas.	STOMP AQUA	N
Obs. ® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).						



• GINJEIRA •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS					
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.
formas hibernantes de insectos e ácaros (tratamento de Inverno)					
óleo de Verão	EC	2739-4000	-	GARBOL	N
cochonilhas					
óleo de Verão	EO	14000	-	OLEOFIX	N
mosca do Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)					
lufenurão	RB	24 iscos/ha	---	ADRESS	N



• GINJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
cancro bacteriano (<i>Pseudomonas</i> spp.)							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	12-105	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Efectuar três tratamentos, respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
				COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	15-125	7	GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • CHAMPION WP • COBRE HIDRÓXIDO ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	300	7	• CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • ULTRA COBRE	Xn		
				COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	300	7	CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
	SC	317-350	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
crivado							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Tratamento à queda da folha e ao entumescimento dos gomos. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. 1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • CHAMPION WP • COBRE HIDRÓXIDO ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-500	7	ULTRA COBRE	Xn		
cobre (sulfato) (2)	XX	250-500	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS(*)	Xn; N		
cobre (sulfato cobre tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
Obs. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							

• GINJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome Comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado (cont.)							
mancozebe (3) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOZEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (4) (**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	14	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4) (**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
lepra							
cobre (sulfato de cobre tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N	--	Tratar à queda da folha e ao entumescimento dos gomos. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
moniliose							
bitertanol	SC	30	14	BAYCOR S	Xi; N		---
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105-200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Tratar no estado B-C. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. 1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE-HIDRÓXIDO-ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-210	7	• CALICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn		
				COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	157-200	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
	SC	207-210	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		

Obs.

(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).

(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.



• GINJEIRA (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome Comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
cobre (sulfato) (2)	XX	250	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N	--	Tratar no estado B-C. Tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		(2) Nunca aplicar após a rebentação.
mancozebe (3)(**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOZEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (4)(**)	WG	160-240	14	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	14	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4)(**)	WG	133-178,6	21	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• GINJEIRA (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
glufosinato de amónio ©	SL	450-1500	---	Após a emergência das infestantes, quando estas se encontram em crescimento activo. Nas infestantes vivazes destrói temporariamente a parte aérea. Não atingir folhas, ramos e frutos.	BASTA S (1)	Xn
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	270-3600	---	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ROUNDUP SUPRA (1)	Is
					MONTANA	N
Obs.						
© Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e ciclo cultural, quando aplicável. (1) Alargamento de espectro para USO MENOR.						



• PESSEGUEIRO •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
formas hibernantes de insectos e ácaros (tratamento de Inverno)							
óleo de Verão (1)	EC	2739-4000	---	GARBOL • TOLFIN	N	--	(1) Tratar no estado B-C.
	EO	3200-4000	---	OLEOFIX • SOLEOL • VEROL • POMOROL	Is		
				KLIK 80	N		
	EW	3200-4000	---	FITANOL	N		
ácaros							
spirodiclofena ® (2)	SC	72-96	14	ENVIDOR	Xn; N	máx. 1 aplic. (2)	(2) Máximo 1 aplicação por ciclo cultural e para o conjunto das finalidades.
aranhão amarelo							
bifentrina ®	EC	4	7	TALSTAR (*)	Xn; N	máx. 2 aplic.	
spirodiclofena ® (2)	SC	72-96	14	ENVIDOR	Xn; N	máx. 1 aplic. (2)	(2) Máximo 1 aplicação por ciclo cultural e para o conjunto das finalidades.
aranhão vermelho e outros ácaros tetraniquídeos							
fenepiroximato (4)	SC	5,5-7,95	28	DINAMITE	Xi; N	máx. 1 aplic. (4)	(4) Realizar no máximo 1 aplicação com insecticidas do grupo METI, por ciclo cultural e para o conjunto das finalidades.
spirodiclofena ® (2)	SC	72-96	14	ENVIDOR	Xn; N	máx. 1 aplic. (2)	(2) Máximo 1 aplicação por ciclo cultural e para o conjunto das finalidades.
afídeos							
acetamiprida ® (3)	SP	5	14	EPIK • GAZELLE	Xn; N	máx. 2 aplic. (3)	(3) Grupo neonicotinóides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável.
	SG	5	14	EPIK SG • GAZELLE SG	Xn; N		
flonicamida (10)	WG	60-70 gsa/ha	14	TEPPEKI	Is	máx. 2 aplic. (10)	
imidaclopride (3)	SL	10	14	CONDOR • CONFIDOR CLASSIC • COURAZE • SOLAR • KOHINOR 20 SL • MASTIM • WARRANT 200 SL • NUPRID 200 SL • NEOMAX • CORSÁRIO	N	máx. 2 aplic. (3)	(10) Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 aplicações, por ciclo cultural.
				CORSÁRIO	Xi; N		
	OD	10,3	14	CONFIDOR O-TEQ	Xi; N		
	WG	10,5	14	COURAZE WG	Xn; N		
Obs.							
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.							



• PESSEGUEIRO (Cont.) •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
Afídeos (cont.)							
pimetrozina (5)	WG	5-10	14	PLENUM 50 WG	Xn; N	máx. 3 trat. (5)	(5) Não efectuar mais de 3 tratamentos com esta s.a. nem com outro insecticida com o mesmo modo de acção.
tiaclopride ® (3)	SC	7,2-9,6	14	CALYPSO	Xn; N	máx. 2 aplic. (3)	(3) Grupo neonicotinóides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável. (8) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares).
tiametoxame ® (3)	WG	2,5	14	ACTARA 25 WG	N	máx. 2 aplic. (3)(8)	
afídeo verde							
imidaclopride (3)	SL	10	21	CONDOR • CONFIDOR CLASSIC • COURAZE • WARRANT 200 SL • KOHINOR 20 SL • MASTIN • SOLAR • NEOMAX	N	máx. 2 aplic. (3)	(3) Grupo neonicotinóides – máximo duas aplicações, por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando aplicável. (8) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares).
	WG	10,5	21	COURAZE WG	Xn; N	máx. 2 aplic. (3) (8)	
	tiametoxame ® (3)	WG	2,5	14	ACTARA 25 WG		
anársia (Anarsia lineatella)							
indoxacarbe (9)	WG	4,95	7	EXPLICIT WG • STEWARD	Xn; N	máx. 4 aplic. (9)	(9) Para evitar o desenvolvimento de resistências, aconselha-se máximo de 4 aplicações por ciclo cultural.
spinosade ®	SC	9,6-12	7	SPINTOR	N	máx. 2 aplic.	
cochonilha de S. José							
clorpirifos ® (7)	EC	72-96	28	CICLONE 48 EC • CLORFOS 48 PIRIFOS 48 • CLORMAX • PYRINEX 48 EC	Xn; N	máx. 2 aplic.	(7) Tratamento durante o repouso vegetativo adicionando 1200 g de óleo de Verão (80 % emulsão), ou durante o desenvolvimento vegetativo da cultura, na altura da eclosão das larvas (tendo presentes as gerações 2-4 que ocorrem nas condições nacionais com esta praga).
óleo de Verão (1)	EC	684,8-1369,6	---	CITROLE • GARBOL	N		(11) Tratar a partir do estado I (frutos pequenos) e quando se verifique o máximo de eclosões.
	EO	700-1400	---	VEROL	Is		(10) Tratar entre o estado B (entumescimento dos gomos) e E3 (desabrochar).
Obs.							
® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.							



• PESSEGUEIRO (Cont.) •

INSECTICIDAS E ACARICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
cochonilhas							
óleo de Verão (1)	EO	700-1600	---	OLEOFIX • SOLEOL • VEROL • POMOROL	Is		(1) Tratar no estado B-C.
mosca do Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
lambda-cialotrina [®]	CS	1,25	7	KARATE with ZEON technology • NINJA with ZEON technology (7) • JUDO • ATLAS	Xn; N	máx. 2 aplic.	(7) Efectuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Aplicar em filas alternadas e adicionar atractivo alimentar.
lufenurão	RB	24 iscos/ha	---	ADRESS	N		
traça oriental (<i>Grapholita molesta</i>)^Ω							
indoxacarbe	WG	4,95	7	EXPLICIT WG • STEWARD	Xn; N	máx. 4 aplic. (9)	(9) Para evitar o desenvolvimento de resistências, aconselha-se máximo de 4 aplicações por ciclo cultural.
spinosade [®]	SC	9,6-12	7	SPINTOR	N	máx. 2 aplic.	
tripes							
acrinatrina [®] (8)	EW	4,5-7,5	14	RUFAS AVANCE	N	máx. 2 aplic.	(8) Aplicar ao aparecimento da praga.
Obs.							
[®] Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e por ciclo cultural, quando aplicável.							

^Ω feromona homologada para traça oriental	Form.	Indicações	Nome comercial	Classif.
acetato de (Z)-dodec-8-en-1-ilo + acetato de (E)-dodec-8-en-1-ilo + (Z)-dodec-8-en-1-ol	VP	500-600 difusores/ha, utilizados no método da confusão sexual para combater <i>Grapholita molesta</i> . Seguir as recomendações expressas no rótulo.	ISOMAT OFM ROSSO	Is



• PESSEGUEIRO (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
cancro bacteriano (<i>Pseudomonas</i> spp.)							
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	12-105	7	CHAMPION WG • COBRE HIDRÓXIDO ADP • FITOCOBRE • KADOS • KOCIDE 2000 • • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Efectuar três tratamentos, respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. 1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
	WP	15-125		COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	SC	247		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • CHAMPION WP	Xn; N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
cancro (<i>Fusicoccum</i> spp.)							
tirame (2)(**)	WG	160-240	14 42	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAM 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar no início, meio e fim da queda das folhas e repetir ao entumescimento dos gomos.
	WP	160-240		FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (2)(**)	WG	133-178,6	--	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(2) Não efectuar mais de 3 aplicações.
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• PESSEGUEIRO (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado							
captana	WP	150-200	21	MALVIN 83 WP	Xn; N	--	
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105 – 200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N	--	Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • CHAMPION WP • COBRE – HIDRÓXIDO – ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-500	7	BLAURAME • CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn		(1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes.
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	105-500	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
	SC	125-501	7	CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
				COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
	XX	250-500	7	FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
cobre (sulfato) (2)				SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		(2) Nunca aplicar após a rebentação.
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							

• PESSEGUEIRO (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
crivado (cont.)							
mancozebe (3) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG • NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(3) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE	Xn; N		
				DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP	Xi; N		
				MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOSEBE 80 WP	Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
tirame (4) (**)	WG	160-240	42	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAME 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	42	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4)(**)	WG	133-178,6	---	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Não efectuar mais de 3 aplicações. Aplicar só até ao fim da floração.
lepra							
captana	WP	150-200	21	MALVIN 83 WP	Xn; N		
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105 – 200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N		Tratamento à queda da folha com a concentração mais elevada e ao entumescimento dos gomos (estado B-C), com a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • CHAMPION WP • COBRE-HIDRÓXIDO-ADP FITOCOBRE	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-500	7	BLAURAME • CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAM BLU • ULTRA COBRE	Xn		(1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação. Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa.
				COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
	WG	105-500	7	IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
	SC	125-501	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
				CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
Obs. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001). (**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							

● PESSEGUEIRO (Cont.)●

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
Lepra (cont.)							
cobre (sulfato) (2)	XX	250-750	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N		Tratamento à queda da folha com a concentração mais elevada e ao entumescimento dos gomos (estado B-C), com a concentração mais baixa. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação. Realizar uma aplicação à queda da folha usando a concentração mais elevada e repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa.
cobre (sulfato de cobre e cálcio – mistura bordalesa) (2)	WP	250 - 750	7	CALDA BORDALESA SAPEC • CALDA BORDALESA SELECTIS • CALDA BORDALESA QUIMIGAL (*)	N		
				CALDA BORDALESA RSR • CALDA BORDALESA QUIMAGRO • CALDA BORDALESA CAFFARO 20 • BORDEAUX CAFFARO 13	Xn; N		
				CALDA BORDALESA VALLES • CALDA BORDALESA NUFARM	Xi; N		
	WG	250-750		PEGASUS WG	Xi; N		
cobre (sulfato de cobre tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
dodina	WP	87,75	14	SYLLIT 65 WP	Xn; N	--	Em condições favoráveis à doença tratar desde o entumescimento dos gomos até ao vingamento do fruto. (5) Tratamento antes da floração. (6) Tratamento após a floração.
enxofre	WP	240-320 (5) 160-240 (6)	---	COSAN WP ENXOFRE MOLHÁVEL CC • ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN	Xi Is		
	WG	240-320 (5) 160-240 (6)	---	STULLN ADVANCE STULLN WG ADVANCE	Is		
	SC	240-320 (5) 160-240 (6)	---	HEADLAND SULPHUR COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX • VISUL	Is Xi		
tiram (4) (**)	WG	160-240	42	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAME 80 WG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar à queda das folhas ao entumescimento dos gomos e em condições favoráveis até ao vingamento dos frutos. (4) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WP	160-240	42	FERNIDE WP	Xn; N		
zirame (4)(**)	WG	133-178,6	--	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	(4) Aplicar só até ao fim da floração. Não efectuar mais de 3 aplicações.
Obs. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001). (**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



● PESSEGUEIRO (Cont.)●

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classi f.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose							
bitertanol	SC	30	7	BAYCOR S	Xi; N		
boscalide (7)	WG	20	3	CANTUS	N	máx. 2 aplic. (7)	(7) Realizar no máximo 2 aplicações com fungicidas do grupo SDHI.
captana	WP	150-200	21	MALVIN 83 WP	Xn; N		
cobre (hidróxido) (1) (2)	WG	105 – 200	7	CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE 2000 • KOCIDE 35 DF • KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO • KOCIDE OPTI	Xn; N		Tratar no estado B-C. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico.
		100-125	7	COPERNICO 25% HIBIO • HIDROTEC 20% Hi Bio	Xi; N		
	WP	125-250		GYPSY 50 WP • HIDROTEC 50% WP • MACC 50 • COBRE HIDRÓXIDO-ADP	Xn; N		
cobre (oxicloreto) (2)	WP	200-500	7	BLAURAME • CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • CUPRAVIT • NEORAMBLU • ULTRA COBRE	Xn		(1) O produto tem acção inibidora em bactérias que favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da existência de condições de geada, nas concentrações indicadas, pode proteger geadas fracas. Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
	WG	105-500	7	COBRE 50 SELECTIS • EXTRA COBRE 50 • CURENOX 50	Xn; N		
				IPERION WG • NEORAM MICRO	N		
				NUCOP M 35% HI BIO • OXITEC 25% HI BIO	Xi; N		
				CUPRITAL 50 WG ADVANCE	Xn; N		
	SC	125-501	7	COBRE FLOW CAFFARO	Xn		
cobre (sulfato) (2)	XX	250	7	CUPROCOL • CUPRITAL SC • INACOP-L • CUPROCOL INCOLOR	Xn; N		Tratar no estado B-C. Os tratamentos seguintes não devem ser efectuados com um fungicida cúprico. (2) Nunca aplicar após a rebentação.
				FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU • FLOWRAM CAFFARO	N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	SULFATO DE COBRE CRYSTAL (*) • SULFATO DE COBRE MACKECHNIE (*) • SULFATO DE COBRE NEVE (*) • SULFATO DE COBRE CADUBAL • SULFATO DE COBRE VALLÉS (*)	Xn; N		
cobre (sulfato Cu tribásico) (2)	SC	247	7	CUPROXAT	N		
Obs.							
(*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).							



● PESSEGUEIRO (Cont.)●

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
moniliose (cont.)							
enxofre	WP	240-320 (3) 160-240 (4)	---	STULLN	Is		Tratar ao entumescimento dos gomos, início da floração, queda das pétalas e vingamento do fruto, repetir se necessário.
	WG	240-320 (3) 160-240 (4)	--	STULLN—ADVANCE STULLN WG ADVANCE	Is		
	SC	240-320 (3) 160-240 (4)	---	HEADLAND SULPHUR COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX	Is Xi		
mancozebe (5) (**)	WG	157,5-165	28	DITHANE NEOTEC • PENNCOZEB DG • MANFIL 75 WG • STEP 75 WG •NUFOSEBE 75 DG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar ao entumescimento dos gomos, início da floração, queda das pétalas e vingamento do fruto, repetir se necessário. (5) Não efectuar mais de 4 aplicações.
	WP	160	28	CAIMAN WP • FUNGITANE (*) • FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • MANCOZAN • NUTHANE DITHANE AZUL (*) • DITHANE M-45 • • FUNGÉNE • MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP MANCOZEBE 80 VALLÉS • NUFOZEBE 80 WP	Xn; N Xi; N Xi		
	SC	159	28	DITHANE M-45 FLO (*) • PENNCOZEB FLOW(*)	Xi; N		
	WG	160-240	42	FERNIDE WG • POMARSOL ULTRA D • THIANOSAN • TIDORA G • TM – 80 • URAME 80 WG	Xn; N		
tirame (6) (**)	WP	160-240	42	FERNIDE WP	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Tratar ao entumescimento dos gomos, início da floração, queda das pétalas e vingamento do fruto, repetir se necessário. (6) Não efectuar mais de 3 aplicações.
	WG	133-178,6	--	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N		
zirame (6) (**)	WG	133-178,6	--	THIONIC WG (*) • THIONIC WG • ZICO • ZIDORA AG	Xn; N	máx. 2 aplic. consecutivas	Aplicar só até ao fim da floração. (6) Não efectuar mais de 3 aplicações.
Obs. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001). (**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contêm ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre ditiocarbamatos.							



• PESSEGUEIRO (Cont.) •

FUNGICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
oídio (5)							
bitertanol	SC	25-30	7	BAYCOR S	Xi; N	---	---
enxofre	WP	160-320	---	COSAN WP ENXOFRE MOLHÁVEL CC • ENXOFRE MOLHÁVEL EPAGRO (*) • ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS • STULLN • ENXOFRE MOLHÁVEL ORMENTAL	Xi Is	---	Aplicar após a floração usando a concentração mais elevada. Realizar os tratamentos seguintes com a concentração mais baixa.
	WG	160-320	--	THIOVIT JET • ENXOFRE PALLARÉS 80 WG • ENXOFRE MICRONIZADO AGROQUISA • ALASCA MICRO	Xi		
				COSAN WDG • KUMULUS S • STULLN ADVANCE STULLN WG ADVANCE • MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS	Is		
	SC	160-400	---	SUFREVIT • HEADLAND SULPHUR STULLN FL • COSAN ACTIVE FLOW • ENXOFRE FLOW SELECTIS • HÉLIOSOUFRE • LAINXOFRE L • SUPER SIX •	Is Xi		
penconazol	EC	3,5	14	DOURO • PENCOL	N	---	Aplicar logo após os primeiros sintomas.
tetraconazol	EC	4	7	TOPAZE DOMARK	Xi; N N	máx. 2 aplic. (8)	
trifloxistrobina (7)	WG	5 - 7,5	7	FLINT • CONSIST	Xi; N	máx. 3 aplic. (7)	Aplicar logo após os primeiros sintomas. (7) Realizar no máximo 3 aplicações por ciclo cultural, com fungicidas do grupo QoI.



• PESSEGUEIRO (Cont.) •

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas						
cicloxidime	EC	200 (a) 200-400 (b)	28	Após a emergência da cultura e com as infestantes em estado de crescimento activo. Aplicar desde a fase de 3 folhas até ao início do afilhamento. (a) teor em s. a. 200g/l - gramíneas anuais. (b) teor em s. a. 100g/l - gramíneas anuais e vivazes	FOCUS ULTRA	Xi
fluazifope - P-butilo	EC	250-375	7	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo.	CAMPUS TOP • FUSILADE MAX • MONARK	Xi; N
quizalofope-P-etilo	EC	50-150	---	Após a emergência das infestantes.	TARGA GOLD	Xn; N
monocotiledóneas e dicotiledóneas						
amitrol	SG	1720 a 2580 (1) 2580 (2)	---	(1) dicotiledóneas em desenvolvimento e gramíneas até ao afilhamento. (2) dicotiledóneas desenvolvidas e gramíneas até ao encanamento.	CARAMBA • MAXATA	Xn; N
amitrol+tiocianato de amónio	SC	960+860- 1440+1290	---	Aplicar após a emergência das infestantes, de preferência no período de maior crescimento activo.	ETIZOL TL • TRIVIAL	Xn
diflufenicão + glifosato	SC	240+960- 320+1280	---	Após a emergência das infestantes. Não aplicar em pomares com menos de 4 anos. Não atingir as partes verdes da cultura.	ALIADO • FUJI • TRONX SUPER • ZARPA	Xi
glifosato (sal de amónio)	SG	272-3600	28	Após a emergência das infestantes quando estas se encontram em crescimento activo. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	BUGGY 360 SG • ROUNDUP FORTE	Xi; N
	SL	720-2520	28	Após a emergência das infestantes quando estas se encontram em crescimento activo. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	TOUCHDOWN • PREMIUM TORNADO	Is



• PESSEGUEIRO (Cont.)•

HERBICIDAS						
Substância activa	Form	Dose (g s.a. / ha)	IS Dias	Condições de aplicação	Nome comercial	Classif.
monocotiledóneas e dicotiledóneas (cont.)						
glifosato (sal de isopropilamónio)	SL	540-3600	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em pomares com menos de 3 anos. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ASTERÓIDE • PREMIER 45 ENVISION • COSMIC • ROUNDUP ULTRA • ROUNDUP SUPRA • OXALIS • GLYPHOGAN (AV 0163)	Is
					MARQUI • GLIFOPEC	Xi
					CLINIC ACE • 360 G • GLIFOS • GLIFOS ACCELERATOR • GLIFOSATO SAPEC • GLIFOSATO SELECTIS • MONTANA • PITON VERDE • PREMIER	N
					RONAGRO • BUGGY • GLYPHOGAN (AV 0055)(*) • GLIFOTOP • LOGRADO • NUFOSATE • RADIKAL • RAUDO • ROUNDUP • RUMBO VALLÉS • TOMCATO	Xi; N
					ACCELERATOR 45 • ARBONAL STAR 45 • ENVISION 45	Is
glifosato(sal de potássio)	SL	270-2160	28	Após a emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Não aplicar em vinhas e pomares com menos de 3 anos. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	ROUNDUP BRONCO	N
					SUPER STING • ROUNDUP GPS	Xi; N
glufosinato de amónio®	SL	450-1500	---	Em pós-emergência das infestantes, quando se encontram em crescimento activo. Nas infestantes vivazes destrói temporariamente a parte aérea. Durante a aplicação não atingir folhas, ramos e frutos.	BASTA S	Xn
oxifluorfená	EC	700-960	---	A partir do 2º ano de plantação durante o repouso vegetativo e ou após o vingamento dos frutos desde que a aplicação seja dirigida ao solo. A aplicação pode ser feita antes da emergência das infestantes ou na fase de plântula.	GALIGAN 240 EC • OXIGAN 240 EC • OXIFENA 240 EC (*)	Xi; N
					DAKAR • EMIR • FUEGO SAPEC • GLOBAL • DAKAR	Xn; N
	SC	720-960	---	Aplicação dirigida ao solo. Aplicação durante o repouso vegetativo.	GOAL SUPREME • GALIGAN 500 SC	N
pendimetalina	CS	1137 - 1365	---	Aplicar desde o final da colheita até ao vingamento dos frutos. Não atingir ramos e folhas.	STOMP AQUA	N
	EC			Aplicar em viveiros de pessegueiro em pré ou pós plantação das estacas. Em aplicação de pós-plantação não atingir as extremidades dos lançamentos do ano.	STOMP 33 E • PROWL • ACTUVUS WG	Xi; N
				ACTIVUS	Xn; N	
Obs. ® Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância activa no máximo duas aplicações por finalidade e ciclo cultural, quando aplicável. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR www.dgadr.pt (produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada _ Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001).						



• PRUNÓIDEAS •

MOLUSCICIDAS							
Substância activa	Form	Concentração (g s.a. / hl)	IS Dias	Nome comercial	Classif.	Nº de aplicações	Condições de utilização
caracóis e lesmas (1)							
metiocarbe (2)	GB	120 (3)	(4)	DRAZA (*) • MESUROL ANTILESMA • MESUROL 50	Xn; N		(1) Não utilizar caracóis mortos na alimentação humana ou animal. (2) Culturas não especificadas. (3) Espalhamento manual ou mecânico em cultura extensiva. (4) Não aplicar junto de culturas comestíveis a menos de três semanas da colheita. (*) Consultar lista de cancelamento de uso para produtos comerciais disponível no site da DGADR.

ALTERAÇÃO DE MARCA COMERCIAL					
Nome actual	Nome anterior	Substância activa	APV/AV	Data de alteração	Empresa
FITOCOBRE	COBRE HIDRÓXIDO ADP	COBRE (HIDRÓXIDO)	4007	23/02/11	FERT I FITO
STULLN WG ADVANCE	STULLN ADVANCE	enxofre	3732	18/11/05	SAPEC AGRO

Salienta-se ainda que:

- a consulta destes quadros não dispensa a **leitura atenta do rótulo** do respectivo produto fitofarmacêutico;
- para qualquer dúvida relativamente ao **cancelamento de AVs e APV's** deverá ser consultada a listagem disponível no site em www.dgadr.pt (*produtos fitofarmacêuticos _ lista de produtos com venda autorizada_Listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001*).